## 術前休薬基準(外科系) ※休薬期間は術前日を1日目とする

	6類		度剤名 	休薬期間
		一般名 ワルファリンカリウム	欠発品 ワーファリン	3~5日
				3~5日 1~2日(Cer50mL/min以上
抗凝固薬		ダビガトラン	プラザキサ	2~4日(Ccr30~49mL/mi
		リバーロキサバン	イグザレルト	1日
		アピキサバン	エリキュース	1~2日
		エドキサバン アスピリン	リクシアナ	1日
抗血小板薬		アスピリン・ランソプラゾール配合錠	バイアスピリン タケルダ配合錠	7~14日
		アスピリン・ボノプラザン配合錠	キャブピリン配合錠	
		アスピリン・ダイアルミネート	バファリン配合錠	
		チクロピジン	パナルジン	10~14日
		クロピドグレル	プラビックス	10~14日
		プラスグレル	エフィエント	14日
		チカグレロル	ブリリンタ	5日
		クロピドグレル・アスピリン	コンプラビン配合錠	10~14日
		シロスタゾール	プレタール	3 日
		サルポグレラート	アンプラーグ	1~2日
PG製剤		ベラプロスト	ドルナー/プロサイリン/ベラサスLA	1日
		リマプロストアルファデクス	プロレナール/オパルモン	1日
冠血管拡張薬		イフェンプロジル	セロクラール	1~2日
		ニセルゴリン	サアミオン	2~3日
		イブジラスト	ケタス	3 日
脳循環・代謝賦活薬 脂質異常症治療薬		ジラゼプ	コメリアンコーワ	2~3日
		トラピジル	ロコルナール	3 ~ 4 日
		ジピリダモール	ペルサンチン	2日
		イコサペントエン酸エチル	エパデール	7~10日
	7 11 . /\>\rangle   11 \ /\>\rangle   11 \ /\>\rangle   11 \ /\>\rangle   12 \ /\rangle   12 \ /\rangle   13 \ /\rangle   13 \ /\rangle   14 \ /\rangle   14 \ /\rangle   14 \ /\rangle   15 \ /\rangle	オメガ-3脂肪酸エチル	ロトリガ	7~10日
	インスリン分泌促進薬 SU剤	-		
	α-グルコシダーゼ阻害薬	-		術当日 ※週1回製剤は1週間前
糖尿病治療薬	インスリン抵抗改善薬	一般名省略	薬剤名省略	
	ビグアナイド薬			
	GLP-1受容体作動薬			
	選択的DPP-4 阻害薬			
	SGLT 2 阻害薬	一般名省略	薬剤名省略	3日
骨粗鬆症治療薬	選択的エストロゲン受容体モ	ラロキシフェン塩酸塩	エビスタ	3日
17 11174/11111/17/米	ジュレーター (SERM)	バゼドキシフェン酢酸塩	ビビアント	, ,
抗精神作用薬	モノアミンオキシダーゼ阻害	セレギリン塩酸塩	エフピー	14~21日
	薬 (MAOI)	ラサギリンメシル酸塩	アジレクト	
	山瓜川イよ)	サフィナミドメシル酸塩 炭酸リチウム	エクフィナ リーマス	140
	炭酸リチウム	灰酸リナリム   クロミプラミン塩酸塩	アナフラニール	14日 - - - - - - - - -
		アミトリプチリン塩酸塩	トリプタノール	
		アモキサピン	アモキサン	
		ロフェプラミン塩酸塩	アンプリット	
	三環形抗うつ薬	イミプラミン塩酸塩	トフラニール/イミドール	
		トリミプラミンマレイン酸塩	スルモンチール	
		ノルトリプチリン塩酸塩	ノリトレン	
		ドスレピン塩酸塩	プロチアデン	
女性ホルモン 製剤	低用量経口避妊薬		アンジュ	4 週前~術後 2 週間禁忌
			シンフェーズ	
			トリキュラー	
			ファボワール	
		エストロゲン+プロゲステロン製剤	マーベロン	
			ラベルフィーユ	
			フリウェル配合錠LD	4週前~術後2週間禁忌
	月経困難治療剤		ヤーズ配合錠	
			ヤーズフレックス配合錠	
			ルナベル配合錠	
	黄体ホルモン製剤		ジェミーナ配合錠	
	(抗悪性腫瘍薬)	メドロキシプロゲステロン酢酸エステル	ヒスロンH錠	術後1週間禁忌
	ACE阻害薬	一般名省略	薬剤名省略	術前日夕から
		%配合錠含む	※配合錠含む	
降圧薬	ARB		_	
降圧薬		サクビトリルバルサルタン	エンレスト	
	ARB ARNI	サクビトリルバルサルタン	エンレスト	
前立腺肥大治療薬	ARNI	サクビトリルバルサルタン タダラフィル	ザルティア	25
				2日

麻酔科で休薬対象となっている薬剤について主科で指示がない場合、確認させていただく場合があります。