

羽島市民病院がん化学療法登録レジメン一覧(大腸がん)

| レジメン名 | 薬剤 | 投与方法 | 投与経路 | 投与時間 | 癌種(申請科) |
|---------------------------------|---|---|---|---|------------|
| mFOLFOX6 1クール14日 | L-OHP I-LV 5-FU 5-FU | 85mg/m ² day1 200mg/m ² day1 400mg/m ² day1 2400mg/m ² day1 | 点滴静注 点滴静注 静注 リザーバー持続静注 | 2時間 2時間 46時間 | 大腸癌(外科) |
| bevacizumab+mFOLFOX6 1クール14日 | bevacizumab L-OHP I-LV 5-FU 5-FU | 1次治療5mg/kg 2次治療10mg/kg day1 85mg/m ² day1 200mg/m ² day1 400mg/m ² day1 2400mg/m ² day1 | 点滴静注 点滴静注 点滴静注 静注 リザーバー持続静注 | 初回1.5時間 2回目1時間 3回目以降0.5時間 2時間 2時間 46時間 | 大腸癌(外科) |
| panitumumab+mFOLFOX6 1クール14日 | panitumumab L-OHP I-LV 5-FU 5-FU | 6mg/kg day1 85mg/m ² day1 200mg/m ² day1 400mg/m ² day1 2400mg/m ² day1 | 点滴静注 点滴静注 点滴静注 静注 リザーバー持続静注 | 1時間 2時間 2時間 46時間 | 大腸癌(外科) |
| FOLFIRI 1クール14日 | CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU | 150mg/m ² day1 200mg/m ² day1 400mg/m ² day1 2400mg/m ² day1 | 点滴静注 点滴静注 静注 リザーバー持続静注 | 2時間 2時間 46時間 | 大腸癌(外科) |
| bevacizumab+FOLFIRI 1クール14日 | bevacizumab CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU | 1次治療5mg/kg 2次治療10mg/kg day1 150mg/m ² day1 200mg/m ² day1 400mg/m ² day1 2400mg/m ² day1 | 点滴静注 点滴静注 点滴静注 静注 リザーバー持続静注 | 初回1.5時間 2回目1時間 3回目以降0.5時間 2時間 2時間 46時間 | 大腸癌(外科) |
| panitumumab+FOLFIRI 1クール14日 | panitumumab CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU | 6mg/kg day1 150mg/m ² day1 200mg/m ² day1 400mg/m ² day1 2400mg/m ² day1 | 点滴静注 点滴静注 点滴静注 静注 リザーバー持続静注 | 1時間 2時間 2時間 46時間 | 大腸癌(外科) |
| XELOX 1クール21日 | capecitabine | 1.36m ² 未満:2400mg/day 1.36m ² 以上1.66m ² 未満:3000mg/day 1.66m ² 以上1.96m ² 未満:3600mg/day 1.96m ² 以上:4200mg/day day1-14 | 経口 | 分2朝夕食後 | 大腸癌(消化器内科) |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|--|--------------|---------------------------------|------------|
| | L-OHP | 130mg/m ² day1 | 点滴静注 | 2時間 | |
| bevacizumab+XELOX 1クール21日 | bevacizumab | 7.5mg/kg day1 | 点滴静注 | 初回1.5時間 2回目1時間 3回目以降0.5時間 | 大腸癌(消化器内科) |
| | L-OHP capecitabine | 130mg/m ² day1 1.36m ² 未満:2400mg/day 1.36m ² 以上1.66m ² 未満:3000mg/day 1.66m ² 以上1.96m ² 未満:3600mg/day 1.96m ² 以上:4200mg/day day1-14 | 点滴静注 経口 | 2時間 分2朝夕食後 | |
| panitumumab 1クール14日 | panitumumab | 6mg/kg day1 | 点滴静注 | 1時間 | 大腸癌(外科) |
| panitumumab+CPT-11 1クール14日 | panitumumab CPT-11 | 6mg/kg day1 150mg/m ² day1 | 点滴静注 点滴静注 | 1時間 1.5時間 | 大腸癌(外科) |
| cetuximab+CPT-11 1クール49日 | cetuximab | 1クールday1のみ400mg/m ² 1クールday8以降250mg/m ² day1、8、15、22、29、36、43 | 点滴静注 | 1クールday1 2時間 1クールday8以降 1時間 | 大腸癌(外科) |
| | CPT-11 | 150mg/m ² day1、15、29 | 点滴静注 | 1.5時間 | |
| cetuximab+mFOLFOX6 1クール14日 | cetuximab | 1クールday1のみ400mg/m ² 1クールday8以降250mg/m ² day1、8 | 点滴静注 | 1クールday1 2時間 1クールday8以降 1時間 | 大腸癌(外科) |
| | L-OHP | 85mg/m ² day1 | 点滴静注 | 2時間 | |
| | I-LV | 200mg/m ² day1 | 点滴静注 | 2時間 | |
| | 5-FU | 400mg/m ² day1 | 静注 | | |
| | 5-FU | 2400mg/m ² day1 | リザーバー持続静注 | 46時間 | |
| cetuximab+FOLFIRI 1クール14日 | cetuximab | 1クールday1のみ400mg/m ² 1クールday8以降250mg/m ² day1、8 | 点滴静注 | 1クールday1 2時間 1クールday8以降 1時間 | 大腸癌(外科) |
| | CPT-11 | 150mg/m ² day1 | 点滴静注 | 2時間 | |
| | I-LV | 200mg/m ² day1 | 点滴静注 | 2時間 | |
| | 5-FU | 400mg/m ² day1 | 静注 | | |
| | 5-FU | 2400mg/m ² day1 | リザーバー持続静注 | 46時間 | |
| bevacizumab+SOX 1クール21日 | bevacizumab | 7.5mg/kg day1 | 点滴静注 | 初回1.5時間 2回目1時間 3回目以降0.5時間 | 大腸癌(消化器内科) |
| | L-OHP TS1 | 130mg/m ² day1 <1.25m ² :80mg/day 1.25-1.5m ² :100mg/day >1.5m ² :120mg/day | 点滴静注 経口 | 2時間 分2朝夕食後 | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|------------|
| panitumumab+XELOX(MetaPan Study) 1クール21日 | panitumumab L-OHP capecitabine | day1-14 9mg/kg day1 130mg/m ² day1 1.36m ² 未満:2400mg/day 1.36m ² 以上1.66m ² 未満:3000mg/day 1.66m ² 以上1.96m ² 未満:3600mg/day 1.96m ² 以上:4200mg/day day1-14 | 点滴静注 点滴静注 経口 | 1時間 2時間 分2朝夕食後 | 大腸癌(外科) |
| bevacizumab+TS1(BASIC) 1クール42日 | bevacizumab TS1 | 5mg/kg day1、15、29 <1.25m ² :80mg/day 1.25-1.5m ² :100mg/day >1.5m ² :120mg/day day1-28 | 点滴静注 経口 | 初回1.5時間 2回目1時間 3回目以降0.5時間 分2朝夕食後 | 大腸癌(消化器内科) |
| bevacizumab+capecitabine(AVEX) 1クール21日 | bevacizumab capecitabine | 7.5mg/kg day1 1.36m ² 未満:2400mg/day 1.36m ² 以上1.66m ² 未満:3000mg/day 1.66m ² 以上1.96m ² 未満:3600mg/day 1.96m ² 以上:4200mg/day day1-14 | 点滴静注 経口 | 初回1.5時間 2回目1時間 3回目以降0.5時間 分2朝夕食後 | 大腸癌(外科) |
| panitumumab+SOX 1クール21日 | panitumumab L-OHP TS1 | 6mg/kg day1 130mg/m ² day1 <1.25m ² :80mg/day 1.25-1.5m ² :100mg/day >1.5m ² :120mg/day day1-14 | 点滴静注 点滴静注 経口 | 1時間 2時間 分2朝夕食後 | 大腸癌(外科) |
| ramucirumab+FOLFIRI(RAISE) 1クール14日 | ramucirumab CPT-11 I-LV 5-FU 5-FU | 8mg/kg 150mg/m ² day1 200mg/m ² day1 400mg/m ² day1 2400mg/m ² day1 | 点滴静注 点滴静注 点滴静注 静注 リザーバー持続静注 | 1時間 2時間 2時間 46時間 | 大腸癌(外科) |
| bevacizumab+TAS-102(C-TASK FORCE) 1クール28日 | bevacizumab | 5mg/kg day1、15 | 点滴静注 | 初回1.5時間 2回目1時間 3回目以降0.5時間 | 大腸癌(消化器内科) |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|------------|---------------------------------|-----------------|
| | TAS-102 | 70mg/m ² /day day1-5・day8-12 | 経口 | 分2朝夕食後 | |
| afibercept+FOLFIRI 1クール14日 | afibercept | 4mg/kg | 点滴静注 | 1時間 | 大腸癌(外科) |
| | CPT-11 | 150mg/m ² day1 | 点滴静注 | 2時間 | |
| | I-LV | 200mg/m ² day1 | 点滴静注 | 2時間 | |
| | 5-FU | 400mg/m ² day1 | 静注 | | |
| | 5-FU | 2400mg/m ² day1 | リザーバー持続静注 | 46時間 | |
| pembrolizumab 1クール21日 | pembrolizumab | 200mg/body day1 | 点滴静注 | 0.5時間 | 大腸癌MSI-high(外科) |
| bevacizumab+mFOLFOXIRI 1クール14日 | bevacizumab | 5mg/kg | 点滴静注 | 初回1.5時間 2回目1時間 3回目以降0.5時間 | 大腸癌(外科) |
| | CPT-11 | 150mg/m ² day1 | 点滴静注 | 1.5時間 | |
| | L-OHP | 85mg/m ² day1 | 点滴静注 | 2時間 | |
| | I-LV | 200mg/m ² day1 | 点滴静注 | 2時間 | |
| | 5-FU | 2400mg/m ² day1 | リザーバー持続静注 | 46時間 | |
| bevacizumab+XELIRI 1クール21日 | bevacizumab | 7.5mg/kg day1 | 点滴静注 | 初回1.5時間 2回目1時間 3回目以降0.5時間 | 大腸癌(外科) |
| | CPT-11 capecitabine | 200mg/m ² day1 1.31m ² 未満:1800mg/day 1.31m ² 以上1.69m ² 未満:2400mg/day 1.69m ² 以上2.07m ² 未満:3000mg/day 2.07m ² 以上:3600mg/day day1-14 | 点滴静注 経口 | 1.5時間 分2朝夕食後 | |
| cetuximab+SOX 1クール21日 | cetuximab | 1クールday1のみ400mg/m ² 1クールday8以降250mg/m ² day1、8、15 | 点滴静注 | 1クールday1 2時間 1クールday8以降 1時間 | 大腸癌(外科) |
| | L-OHP TS1 | 130mg/m ² day1 <1.25m ² :80mg/day 1.25-1.5m ² :100mg/day >1.5m ² :120mg/day day1-14 | 点滴静注 経口 | 2時間 分2朝夕食後 | |